

LEGENDA TAV. C5

- | | |
|--|---|
| | 1. Vulnerabilità molto bassa:
Campi coltivati;
Campi abbandonati. |
| | 2. Vulnerabilità bassa:
Boschi collinari e submontani di caducifoglie termofile o semi-mesofile;
Arbusti sottomontani a dominanza di Ginopro nano e Uva ursina;
Arbusti collinari e montani;
Fascoli e ganghe collinari e montane;
Krumbschmerna. |
| | 3. Vulnerabilità media:
Boschi montani di caducifoglie mesofile a dominanza di Faggio;
Boscaglie igrofile di Salici e Pioppi e boscaglie meso-igrofile a dominanza di Carpino bianco e Nocciuolo. |
| | 4. Vulnerabilità medio-alta:
Bosco misto di sclerofile sempreverdi e di caducifoglie termofile;
Fascoli sottomontani;
Vegetazione delle rupi;
Vegetazione dei brecceai. |
| | 5. Vulnerabilità alta:
Fascoli pinguoli o periclitamento incendiati. |

CARTA DELLA VEGETAZIONE POTENZIALE

Vegetazione atlantica

- | | |
|--|---|
| | Boschi di <i>Calluna</i> |
| | Arbusti sottomontani |
| | Boschi di caducifoglie mesofile a dominanza di Faggio |
| | Boschi di sclerofite sempreverdi e sclerofite semi-decidue a dominanza di <i>Quercus</i> , <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus</i> |

Vegetazione continentale

- | | |
|--|--|
| | Boschi igrofile a dominanza di Salici e Pioppi e boscaglie meso-igrofile a dominanza di Carpino bianco e Nocciuolo |
| | Vegetazione delle rupi e brecceai |

